CORRECTION GROUPEMENT B JUIN 2004

EXERCICE 1 :

A] Loi normale

1°) X suit $\mathcal{N}(100 ; 0,25)$ donc $X^* = \frac{X - 100}{0,25}$ suit $\mathcal{N}(0 ; 1)$.

Une tige est conforme pour la longueur signifie que sa longueur est comprise entre 99,45 mm et 100,55 mm.

$$\begin{aligned} P(99,45 \leq X \leq 100,55) &= P\left(\frac{99,45 - 100}{0,25} \leq X^* \leq \frac{100,55 - 100}{0,25}\right) \\ &= P(-2,2 \leq X^* \leq 2,2) \\ &= P(X^* \leq 2,2) - P(X^* \leq -2,2) \\ &= \pi(2,2) - \pi(-2,2) \\ &= \pi(2,2) - (1 - \pi(2,2)) \\ &= 2\pi(2,2) - 1 \end{aligned}$$

Lecture de table : $\pi(2,2) = 0,9861$

Donc $P(99,45 \leq X \leq 100,55) = 2 \times 0,9861 - 1 \approx 0,97$.

Donc 97% de la production est conforme pour la longueur.

$$\begin{aligned} 2^\circ) P(100 - h \leq X \leq 100 + h) &= 0,95 \Leftrightarrow P\left(\frac{100 - h - 100}{0,25} \leq X^* \leq \frac{100 + h - 100}{0,25}\right) = 0,95 \\ &\Leftrightarrow P(-4h \leq X^* \leq 4h) = 0,95 \\ &\Leftrightarrow P(X^* \leq 4h) - P(X^* \leq -4h) = 0,95 \\ &\Leftrightarrow \pi(4h) - \pi(-4h) = 0,95 \\ &\Leftrightarrow \pi(4h) - (1 - \pi(4h)) = 0,95 \\ &\Leftrightarrow 2\pi(4h) - 1 = 0,95 \\ &\Leftrightarrow \pi(4h) = \frac{1,95}{2} = 0,975 \end{aligned}$$

Lecture de table : $\pi(1,96) = 0,975$

D'où $4h = 1,96 \Leftrightarrow h = 0,49$.

95% de la production sont des tiges dont les longueurs font entre 99,51 mm et 100,49 mm.

B] Loi Binomiale - Loi de Poisson

1°) Epreuve de Bernoulli : On prélève une tige dans la production, celle-ci a une longueur conforme ou non.

Succès : la tige n'est pas conforme pour la longueur : $p = 0,03$

On réalise 50 fois, de manières indépendantes, cette épreuve, car le prélèvement des 50 tiges est assimilé à un tirage avec remise. $n = 50$

Donc Y suit $\mathcal{B}(50 ; 0,03)$

$$2^\circ) P(Y = 2) = C_{50}^2 0,03^2 \times 0,97^{47} = 1225 \times 0,03^2 \times 0,97^{47} \approx 0,26$$

$$\begin{aligned} 3^\circ) P(Y \leq 2) &= P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) \\ &= C_{50}^0 0,97^{50} + C_{50}^1 0,03 \times 0,97^{49} + C_{50}^2 0,03^2 \times 0,97^{48} \\ &= 0,97^{50} + 50 \times 0,03 \times 0,97^{49} + 1225 \times 0,03^2 \times 0,97^{48} \\ &\approx 0,81 \end{aligned}$$

$$4^\circ) \lambda = np = 50 \times 0,03 = 1,5$$

5°) Z suit $\mathcal{P}(1,5)$

Par lecture de table : $P(Z = 2) = 0,251 \approx 0,25$

$$P(Z \leq 2) = 0,223 + 0,335 + 0,251 = 0,809 \approx 0,81$$

C] Intervalle de confiance

$$\bar{D} \text{ suit } \mathcal{N}\left(\mu; \frac{\sigma}{\sqrt{50}}\right) = \mathcal{N}\left(\mu; \frac{0,19}{\sqrt{50}}\right)$$

1°) L'échantillon prélevé a une moyenne de $\bar{x} = 9,99$.

L'estimation ponctuelle de la moyenne est donc de $\mu = 9,99$.

2°) On cherche h tel que $P(\bar{x} - h \leq \bar{D} \leq \bar{x} + h) = 0,95$.

$$\bar{D} \text{ suit } \mathcal{N}\left(\mu; \frac{0,19}{\sqrt{50}}\right) \text{ donc } \bar{D}^* = \frac{\bar{D} - \mu}{\frac{0,19}{\sqrt{50}}} \text{ suit } \mathcal{N}(0 ; 1).$$

On prendra $\mu = \bar{x} = 9,99$ comme approximation de μ .

$$\begin{aligned} P(\bar{x} - h \leq \bar{D} \leq \bar{x} + h) &= 0,95 \Leftrightarrow P\left(\frac{\bar{x} - h - \bar{x}}{\frac{0,19}{\sqrt{50}}} \leq \bar{D}^* \leq \frac{\bar{x} + h - \bar{x}}{\frac{0,19}{\sqrt{50}}}\right) = 0,95 \\ &\Leftrightarrow P\left(\frac{-h\sqrt{50}}{0,19} \leq \bar{D}^* \leq \frac{h\sqrt{50}}{0,19}\right) = 0,95 \\ &\Leftrightarrow P\left(\bar{D}^* \leq \frac{h\sqrt{50}}{0,19}\right) - P\left(\bar{D}^* \leq \frac{-h\sqrt{50}}{0,19}\right) = 0,95 \\ &\Leftrightarrow \pi\left(\frac{h\sqrt{50}}{0,19}\right) - \pi\left(\frac{-h\sqrt{50}}{0,19}\right) = 0,95 \\ &\Leftrightarrow \pi\left(\frac{h\sqrt{50}}{0,19}\right) - \left(1 - \pi\left(\frac{h\sqrt{50}}{0,19}\right)\right) = 0,95 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow 2\pi \left(\frac{h\sqrt{50}}{0,19} \right) - 1 = 0,95$$

$$\Leftrightarrow \pi \left(\frac{h\sqrt{50}}{0,19} \right) = 0,975$$

Lecture de table : $\pi(1,96) = 0,95$

D'où $\frac{h\sqrt{50}}{0,19} = 1,96 \Leftrightarrow h = \frac{1,96 \times 0,19}{\sqrt{50}} \cong 0,05$

On a donc $P(9,99 - 0,05 \leq \bar{D} \leq 9,99 + 0,05) = 0,95 \Leftrightarrow P(9,94 \leq \bar{D} \leq 10,04) = 0,95$
 L'intervalle de confiance de la moyenne μ des diamètres, au seuil de confiance de 95%, est donc : [9,94 ; 10,04].

On peut de contenter de donner directement le résultat du cours, mais attention, dans ce cas il ne vous sera pas attribué la totalité des points à la question. Ce qui est quand même mieux qu'en général où « toute réponse non justifiée ne rapporte aucun point ».

L'intervalle $\left[\bar{x} - t \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$ est appelé intervalle de confiance de la moyenne de la population avec le coefficient de confiance de $\alpha\%$ (ou avec le risque de $(100 - \alpha)\%$).

t vérifie : $2\pi(t) - 1 = \frac{\alpha}{100}$

3°) Faux.

En effet, il s'agit d'un intervalle de confiance à 95%, pas à 100%. Donc μ a 5% de chance de se trouver à l'extérieur.

On ne demande pas de justification pour cette réponse, mais sans celle-ci ce n'est pas évident de comprendre le choix du faux.

EXERCICE 2 :

A] Résolution d'une équation différentielle

1°) $(E_0) : y' + 0,4xy = 0$

La solution générale de (E_0) est $y_0(x) = Ce^{-G(x)}$ où G est une primitive de $x \mapsto 0,4x$

Donc $G(x) = 0,4 \frac{x^2}{2} = 0,2x^2$

$y_0(x) = Ce^{-0,2x^2}$ où $C \in \mathbb{R}$.

2°) $\left. \begin{matrix} h(x) = 1 \\ h'(x) = 0 \end{matrix} \right\} h'(x) + 0,4xh(x) = 0,4x$

Donc h est bien une solution particulière de (E) .

3°) La solution générale de (E) est $y(x) = y_0(x) + h(x) = Ce^{-0,2x^2} + 1$

4°) F solution de (E) donc $F(x) = Ce^{-0,2x^2} + 1$

$\left. \begin{matrix} F(0) = 0 \\ F(0) = C + 1 \end{matrix} \right\} C = -1$

Donc $F(x) = -e^{-0,2x^2} + 1$

Le choix du F n'est pas génial, on pourrait confondre avec une primitive, mais c'est ce F qui est donné dans l'énoncé.

B] Étude d'une fonction

1°) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ donc $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}$ en $+\infty$.

2°) a) $f'(x) = e^{-0,2x^2}(0,4 - 0,16x^2)$
 $= 0,4e^{-0,2x^2}(1 - 0,4x^2)$
 $= 0,4e^{-0,2x^2}(1 - x\sqrt{0,4})(1 + x\sqrt{0,4})$

b) $x \in \mathbb{R}^+$, donc $f'(x)$ est du signe de $1 - x\sqrt{0,4}$.

$1 - x\sqrt{0,4} = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{\sqrt{0,4}}$

Si $x \in \left[0, \frac{1}{\sqrt{0,4}} \right] : f(x) \geq 0$ et si $x \in \left[\frac{1}{\sqrt{0,4}}; +\infty \right[: f'(x) \leq 0$

c)

x	0	$\frac{1}{\sqrt{0,4}}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
			-
f	0	0,38	0

$f(0) = 0$
 $f\left(\frac{1}{\sqrt{0,4}}\right) \approx 0,38$

Attention, de manière générale il faut toujours donner des valeurs exactes dans un tableau de variation, mais ici, il est explicitement demandé de donner une valeur approchée, donc on est obéissant ...

3°) L'équation de $\mathcal{F}$ est donnée par la partie régulière de degré 1 du développement limité en 0 à l'ordre 3 de $f(x)$.

Donc $\mathcal{F} : y = 0,4x$

On a $f(x) - 0,4x = -0,08x^3 + x^3 \varepsilon(x)$

Donc pour $x \geq 0$, on a $-0,08x^3 < 0$.

Donc pour $x \geq 0$ et x proche de 0, on a $f(x) - 0,4x < 0$, donc $\mathcal{C}$ est au dessous de $\mathcal{F}$.

4°)

N'oubliez pas de placer la tangente horizontale, bien qu'elle ne soit pas demandée.

C] Application à un problème de probabilité.

Attention pour cette partie, bien qu'elle soit « vendue » pour une question de probabilité, en réalité aucune notion de probabilité n'est utilisée dans cette question.

$$1^\circ) P(X \leq 4) = \int_0^4 f(t)dt = 1 - e^{-0,2 \times 16} \approx 0,96$$

Une année donnée, il y a 96% de chances que l'agglomération soit protégée de la crue.

$$2^\circ) \text{a) } P(X \leq x_0) = 0,99 \Leftrightarrow \int_0^{x_0} f(t)dt = 0,99$$

$$\Leftrightarrow 1 - e^{-0,2 x_0^2} = 0,99$$

$$\Leftrightarrow - e^{-0,2 x_0^2} = -0,01$$

$$\Leftrightarrow e^{-0,2 x_0^2} = 0,01$$

$$\Leftrightarrow -0,2 x_0^2 = \ln(0,01)$$

$$\Leftrightarrow x_0^2 = \frac{\ln(0,01)}{-0,2}$$

$$x_0 \text{ étant positif, on a : } x_0 = \sqrt{\frac{\ln(0,01)}{-0,2}} = \sqrt{\frac{-\ln(10)}{-0,2}} = \sqrt{10 \ln(10)}$$

$$\text{b) } x_0 \approx 4,80 \text{ m}$$

$$\text{c) } P(X \leq 5) = \int_0^5 f(t)dt = \int_0^{x_0} f(t)dt + \int_{x_0}^5 f(t)dt = 0,99 + \int_{x_0}^5 f(t)dt$$

f étant positive alors $\int_{x_0}^5 f(t)dt > 0$ d'où $P(X \leq 5) > 0,99$

L'affirmation est donc vraie.

On ne demande pas de justification pour cette réponse, mais sans celle-ci ce n'est pas évident de comprendre le choix du vrai.